

In the name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful



### Copyright disclaimer

"La faculté" is a website that collects copyrights-free medical documents for non-lucrative use.

Some articles are subject to the author's copyrights.

Our team does not own copyrights for some content we publish.

"La faculté" team tries to get a permission to publish any content; however, we are not able to contact all the authors.


If you are the author or copyrights owner of any kind of content on our website, please contact us on:  
facadm16@gmail.com

All users must know that "La faculté" team cannot be responsible anyway of any violation of the authors' copyrights.

Any lucrative use without permission of the copyrights' owner may expose the user to legal follow-up.




# *La région sterno- cléido- mastoïdienne*




# Introduction

- ❑ Partie latérale de la gorge
- ❑ En avant du rachis et des scalènes
- ❑ En dehors de la gaine viscérale du cou
- ❑ Contenu:
  - Paquet vasculo nerveux carotidien
  - Sympathique cervical




# Limites

- En avant: bord antérieur du SCM
- En arrière: bord postérieur du SCM
- En haut: une ligne horizontale entre mastoïde et l'angle de la mandibule
- En bas: fourchette sternale et clavicule
- En profondeur le rachis cervical








# Paquet vasculo-nerveux

- ☐ La carotide primitive
- ☐ La carotide externe
- ☐ La carotide interne
- ☐ La veine jugulaire interne
- ☐ Le pneumogastrique
- ☐ L'anse de l'hypoglosse
- ☐ La chaîne lymphatique





# Carotide primitive

## Le paquet vasculo nerveux du cou

### ■ La carotide primitive

#### ■ origine:


- à droite: le tronc artériel brachio céphalique
- à gauche: la crosse de l'aorte

#### ■ trajet:

- oblique en haut en DH et en arrière
- Rapport avec le tubercule transversaire ant de C6
- Aucune collatérale

#### ■ Terminaison:

- C4 = bord supérieur du cartilage thyroïde
- Dilatation= sinus carotidien
- Carotide interne poursuit la direction dans l'espace latéro pharygien
- Carotide externe accolée en canon de fusil à l'origine se dirige vers l'angle mandibulaire




# Carotide interne

## Le paquet vasculo nerveux du cou

### ■ La carotide interne

- en position postéro externe à l'origine
- Se dirige en haut et en dedans
- Croise à angle aigue la face post de la carotide externe
- Sous le digastrique
- Aucune collatérale






# Carotide externe


## Le paquet vasculo nerveux du cou


### ■ La carotide externe

- En position antéro interne à l'origine
- Monte en haut et en dehors
- Sous le digastrique
- Collatérales:
  - thyroïdienne supérieure
  - linguale
  - faciale
  - pharyngienne ascendante
  - Occipitale
  - Auriculaire postérieure



# Branches collatérales et Branches terminales







# Veine jugulaire interne

## Le paquet vasculo nerveux du cou

---

### □ La veine jugulaire interne

#### ■ Origine:

- Trou déchiré postérieur
- Fait suite au sinus latéral


#### ■ Trajet:

- Dilatation initiale: le golf de la jugulaire
- Dilatation terminale: le sinus jugulaire
- En position post à l'artère à l'origine et antéro lat à sa terminaison
- Deux collatérales:
  - Tronc thyro-linguo-facial  
*le triangle de Farabeuf*
  - Veine thyroïdienne moyenne


#### ■ Terminaison: à la base du cou, en s'unissant à la sous clavière pour former le tronc veineux brachio céphalique.

---

# veines profondes du cou




- 1-V.émissaire mastoi
- 2-plexus vein. sub-occip
- 3-v.auricul.post
- 4-v.occipitale
- 5-v.médian.nuque
- 6-v.jugul.pos
- 7-v. cervi profonde
- 8-v.vertébrale
- 9-v.subclavi
- 10-v.tempor superf
- 11-plexus ptérygoi
- 12-v.faciale
- 13-v.rétromandibul
- 14-v.linguale
- 15-tr.v.thyro-lingo-f
- 16-v.thyroid sup
- 17-v.jugul int
- 18-v.vertébr int
- 19-v.thyro moy
- 20-v.jugul ext
- 21-v. int
- 22-v. ext



# Le paquet vasculo nerveux du cou

## □ Le nerf vague ou pneumogastrique

- Dans l'angle dièdre formé ouvert en arrière formé par la jugulaire interne et la carotide (interne et primitive)
- Ses branches naissent en dessous de la région






## Le paquet vasculo nerveux du cou

### □ L'anse de l'hypoglosse

le nerf grand hypoglosse se trouve sous le ventre postérieur du digastrique; il passe entre la carotide interne en dedans et la veine jugulaire interne en dehors; il donne à ce niveau une branche verticale qui chemine à la face externe de la jugulaire jusqu'au tendon de l'omohyoïdien où elle s'anastomose avec une branche du plexus cervical profond (C2 C3) pour former l'anse de l'hypoglosse qui innerve les muscles sous hyoïdiens.



# Le paquet vasculo nerveux du cou

---

## □ La chaîne sympathique cervicale

- Contre l'aponévrose pré vertébrale
- Constitution
  - Ganglion cervical supérieur  
en forme de noyau de date de 3 à 4 cm  
en regard de C1C2
  - Ganglion cervical moyen  
inconstant, position variable (C5 C6)
  - Ganglion cervico thoracique ou stellaire  
unique ou dédoublé par l'artère vertébrale  
rapport avec l'artère thyroïdienne moyenne
  - L'anse sous clavière

